Neocate

Descripción

Dieta elemental nutricionalmente completa, hipoalergénica, a base de aminoácidos libres, de alto valor biológico.
- Con LCTs y nucleótidos.
- Sin proteínas de leche de vaca, lactosa, sacarosa, fructosa ni gluten.
Alimento para usos médicos especiales.

Indicaciones

Indicado en el manejo dietético de la alergia a la proteína de leche de vaca, intolerancia múltiple alimentaria y otras situaciones que requieran una dieta elemental en lactantes para administrar por vía oral o sonda.

Densidad energética

0,67 kcal/ml (13,5% P/V); 4,93 Kcal/g

Reparto energético

Grasas: 47% VCT
Hidratos de carbono: 42 % VCT
Equivalente proteico: 11 % VCT
Fibra alimentaria: 0 % VCT
(VCT: Valor Calórico Total)

Producto	Presentación	Código Nacional	EAN
Neutro	6 Botes de 400 g	505.061	5016533655094

Modo de empleo

Concentración recomendada: Un cacito dosificador raso aporta apróximadamente 4,5 g. Añadir 1

cacito raso de polvo por cada 30 ml de agua para conseguir la concentración recomendada (13,5% P/V). La osmolalidad a esta concentración (i.e. 13,5 g de polvo con agua hasta un volumen final de 100 ml) es 340 mOsmol/kg H2O.
Preparación del biberón:
La salud de su bebé depende de que siga cuidadosamente las instrucciones de preparación y uso. Una preparación incorrecta puede perjudicar a su bebé.
1. Lavarse las manos y limpiar el área de preparación. Esterilizar el biberón y la tetina.
2. Hervir agua fresca durante 5 minutos o hasta que se apague el hervidor eléctrico. Dejar enfriar el agua hervida unos 30 minutos hasta que se sienta templada en la muñeca. Verter la cantidad requerida en el biberón esterilizado.
3. Llenar el cacito incluido en el envase y enrasar con un cuchillo limpio y seco. No comprimir elpolvo dentro del cacito. Utilizar solamente el cacito dosificador incluido en el envase. Añadir el número prescrito de cacitos del producto al agua.
4. Tapar el biberón y agitar hasta que el polvo quede disuelto. Antes de administrarlo, asegúrese de que el preparado se encuentra a la temperatura adecuada dejando caer unas gotas en la muñeca.
5. Desechar los restos de fórmula que queden en el biberón pasada una hora desde su administración. La fórmula no se debe volver a calentar durante la toma.
NOTA: La fórmula infantil en polvo es estéril. La fórmula infantil debe prepararse justo antes de la toma. No hervir la fórmula ni utilizar microondas para preparar o calentar la fórmula.

Dosificación recomendada

La cantidad de producto y la dilución debe determinarla el médico y depende de la edad, el peso y la situación clínica del paciente.

Conservación

Almacenar en lugar fresco y seco. Colocar siempre la tapa después de su uso. Una vez abierto consumir en un mes.

Precauciones

Una buena higiene dental es importante para lactantes y niños, ya que el contacto frecuente o prolongado de los dientes con alimentos o bebidas puede aumentar el riesgo de caries. Es importante una buena higiene bucal después de la última toma por la noche.

Aviso importante

Para uso enteral exclusivamente. No administrar por vía parenteral. Debe utilizarse bajo supervisión médica, después de considerar todas las opciones de alimentación, incluida la lactancia materna. Adecuado como única fuente de alimento lactantes de 0 a 12 meses.

Alérgenos

Hipoalergénico.

Vida útil

18 meses.

Ingredientes

Jarabe de glucosa deshidratado, aceites vegetales refinados (aceite de girasol alto oleico, aceite de coco, aceite de canola, aceite de girasol), L-aspartato de L-arginina, L-leucina, acetato de L-lisina, L-glutamina, L-prolina, emulgente (E472c), L-valina, glicina, L-isoleucina, fosfato dipotásico, L-treonina, L-fenilalanina, L-tirosina, L-serina, L-histidina, L-alanina, fosfato de calcio dibásico, citrato tripotásico, cloruro sódico, carbonato cálcico, bitartrato de colina, L-cistina, glicerofosfato de calcio, L-triptófano, citrato de calcio, cloruro de magnesio, aceite de Crypthecodinium cohnii, L-metionina, fosfato de calcio tribásico, aceite de Mortierella alpina, L-aspartato magnésico, inositol, ácido L-ascórbico, antioxidantes (lecitina de girasol, palmitato de ascorbilo), taurina, sulfato ferroso, sulfato de zinc, L-carnitina, acetato de DL-alfa-tocoferil, sal sódica del UMP (ácido uridina 5'-fosfórico), citidina 5'-monofosfato, nicotinamida, D-pantotenato de calcio, sal sódica del IMP (ácido inosina-5'-fosfórico), adenosina 5'-monofosfato, sal sódica del GMP (ácido guanosina-5'-fosfórico), sulfato de cobre, mononitrato de tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, acetato de retinilo, yoduro potásico, sulfato de manganeso, ácido pteroilmonoglutámico, fitomenadiona, selenito de sodio, cloruro de cromo, molibdato sódico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.

Información nutricional	Por 100 ml		Por 100 g
Valor Energético	67 / 278	Kcal / kJ	493 / 2062
Grasas	3,5	g	25,6
Saturadas	1,3	g	10,0
Monoinsaturadas	1,5	g	11,5
Poliinsaturadas	0,56	g	4,2
Ácido linoléico	0,453	g	3,36
Ácido α-linolénico	0,0456	g	0,34
Ácido araquidónico (AA)	0,0166	g	0,12
Ácido docosahexaenoico (DHA)	0,0166	g	0,12
Hidratos de carbono	7,1	g	52,5
Azúcares	0,62	g	4,6
Equivalente proteico	1,8	g	13,3
Fibra alimentaria	0	g	0
Sal	0,07	g	0,54
Vitaminas			
Vit. A	58,2	µg	431
Vit. D	1,60	µg	11,8
Vit. E	1,48 (1,33)	mg (mg Î±-TE)	11,0 (9,85)
Vit. K	6,00	µg	44,5
Tiamina	0,08	mg	0,59
Riboflavina	0,08	mg	0,59
Niacina	0,55 (1,27)	mg (mg EN)	4,09 (9,41)
Ácido pantoténico	0,41	mg	3,05
Vit. B6	0,06	mg	0,48
Ácido fólico	9,24	µg	68,5
Folato	15,4	µg	114
Vit. B12	0,19	µg	1,38
Biotina	2,59	µg	19,2

Vit. C	7,11	mg	52,7
Minerales y elementos traza			
Na	29,3	mg	217
K	72,9	mg	540
Cl	53,0	mg	392
Ca	77,1	mg	571
P	50,2	mg	372
Mg	7,01	mg	51,9
Fe	1,00	mg	7,39
Zn	0,73	mg	5,42
Cu	0,057	mg	0,42
Mn	0,007	mg	0,049
Mo	1,53	µg	11,3
Se	2,53	µg	18,7
Cr	1,46	µg	10,8
I	14,0	µg	103
Otros			
L-Carnitina	1,33	mg	9,85
Colina	18,5	mg	137
Inositol	14,9	mg	110
Taurina	4,32	mg	32,0
Nucleótidos	2,33	mg	17,2
Osmolaridad	310	mOsmol/l	
Osmolalidad	340	mOsmol/kg H2O	